



DOENÇAS DOS ANIMAIS TRANSMISSÍVEIS AO HOMEM ZOONOSES

Doenças que são partilhadas pelos animais e pelo Homem, designam-se por Zoonoses. Os animais são portadores dos vectores que transportam os agentes infecciosos para o meio ambiente, no qual está o Homem, ou em outras circunstâncias, o animal e o Homem são infectados por partilharem a exposição ambiental ao agente infeccioso ou ao vector. Existem agentes que podem infectar o Homem também por contacto directo com o animal, estes agentes revestem-se de importância em termos de Saúde Pública. A maior parte destes agentes podem infectar e causar doenças em pessoas imunocompetentes, embora as doenças sejam geralmente mais severas em pessoas imunodeficientes. Salientam-se algumas Zoonoses, pela sua prevalência:

Febre da Carrapa ou Piroplasmose transmitida ao Homem e aos animais de companhia pela picada da carrapa. Existe uma variedade de agentes transmitidos pela carrapa que causam doenças; sendo a infecção provocada pela *Babesia spp.*, a mais comum em Portugal. Os sintomas da infecção variam consoante o agente em causa, mas regra geral, manifestam-se cerca de quinze dias após a inoculação com febres altas que podem ir aos 41°C. Os animais de companhia não são transmissores da doença ao Homem. A transmissão é feita através da picada de uma carrapa infectada. As carrapas eclodem quando a temperatura começa a subir, verificando-se a sua maior proliferação entre os meses de Março e Agosto. Para evitar, devem-se aplicar desparasitantes externos especificamente eficazes contra estes parasitas e vacinar os cães contra a Babesiose.



Lepstospirose doença endêmica, bastante comum em épocas de chuva.

É causada pela espiroqueta *Leptospira ssp.*, afectando a maior parte dos animais inclusive o Homem. É transmitida através da urina, água e alimentos contaminados pelo agente, pela penetração da pele com feridas ou pela ingestão de alimentos contaminados. O cão e outros animais como por exemplo o rato, os bovinos e animais silvestres também podem contrair a doença e transmiti-la ao Homem.

Como o cão é o animal doméstico que convive com o Homem de mais de perto, reveste-se de extrema importância tê-lo sempre devidamente vacinado contra esta doença.



A leishmaniose ou calazar é provocada pelos parasitas unicelulares

do género *Leishmania*. Há três tipos de leishmaniose: visceral, que ataca os órgãos internos, cutânea, que ataca a pele, e mucocutânea, que ataca as mucosas e a pele. Em Portugal existe principalmente a leishmaniose visceral e alguns casos (muito raros) de leishmaniose cutânea. As *Leishmania* são transmitidas pelos mosquitos fêmeas dos géneros *Phlebotomus*. É uma doença que se transmite entre os cães pela picada do mosquito e destes ao Homem desde que um mosquito infectado o pique. Assim, a profilaxia reveste-se de extrema importância.

É fundamental a aplicação de desparasitantes externos que tenham a capacidade de fazer a repelência do mosquito que transmite esta doença. Actualmente existem no mercado sob a forma de Spot-on e coleiras insecticidas especialmente formuladas para o efeito.

